



Folkhälsomyndigheten
PUBLIC HEALTH AGENCY OF SWEDEN

معلومات مفید در مورد

ویروس روتا

واکسین بدین ترتیب تطبیق می‌گردد

قبل از تطبیق واکسین

نرس مرکز صحتی اطفال را از چگونگی وضع صحتی فرزندتان مطلع سازید. اگر سوالاتی را در ذهن داشته باشید آنرا مطرح سازید و موضوعات مربوطه را در میان بگذارید.

تطبیق واکسین

این واکسین به شکل قطره در دهان تطبیق میشود و طعم آن شیرین میباشد. اولین دوز در عمر شش هفتگی کودک و دوز دوم در عمر سه ماهگی کودک تطبیق میشود. این واکسین را میتوان همزمان با سایر واکسینها تطبیق کرد.

بعد از تطبیق واکسین

بعد از تطبیق واکسین ممکن است کودک به علائم خفیفی دچار شود که مانند علائم عفونت ویروس روتا به نظر میرسند زیرا واکسین حاوی ویروس روتا ضعیف شده میباشد. این واکسین ممکن است اسهال، نفخ و باد شکم و درد شکم را به همراه داشته باشد ولی این علائم بعد از گذشت یک دو روز از بین میروند.

عفونت ویروس روتا یک بیماری شکم خیلی ساری میباشد و ممکن است در اطفال خوردسال بسیار خطرناک ثابت شود. واکسیناسیون موثرترین شیوه محافظت در برابر این عفونت است.

این ویروس به آسانی سرایت میکند

ویروس روتا به آسانی سرایت میکند و توسط دهان، چوشکها و اسباب بازی پخش میشود. با شستن دستها و سایر سطوح میتوانیم خطر بیمار شدن و انتقال عفونت را کاهش دهیم ولی جلوگیری کامل از انتشار مرض ممکن نیست.

واکسین محافظت مینماید

واکسین ویروس روتا محافظت موثر در مقابل این مرض خطرناک را فراهم میسازد. اطفال خوردسال بسیار حساس و آسیب پذیر در مقابل ضیاع مایعات میباشند، فلذا این محافظت طی اولین دو سال کودک بسیار مهم میباشد.

عفونت ویروس روتا میتواند استفراغ و اسهال حاد را که چندین روز طول میکشد، سبب گردد. اطفال خوردسال میتوانند مایعات بدن را بمقدار زیاد از دست دهند و دچار ضایع مایعات شوند و بسا اوقات نیاز به بستری شدن و مراقبت در شفاخانه بوجود میاید. این بیماری معمولاً در کودکان کمتر از سن دو سال شدیدترین میباشد.

بدون واکسین، تقریباً همه اطفال قبل از تکمیل سن پنج سالگی حد اقل یکبار به عفونت ویروس روتا مبتلا میشوند.



این واکسین به شکل قطره در دهان تطبیق میشود و مزه شیرین دارد.

SKYDD
FÖR LIVET



نکات ذیل را بعد از تطبیق واکسین مد نظر داشته باشید
 این واکسین میتواند مانند همه ادویه منجر به عوارض جانبی گردد. بخش عمده کودکان هیچ علائمی نشان نمیدهند ولی یکتعداد از کودکان دچار اسهال و ممکن درد شکم شوند.
 یکی از عوارض جانبی بسیار نادر درهم روی روده که آنرا تغلف امعا مینامند، است. در چنین حالت کودک میتواند بسیار خسته و بی حال شود، از درد شکم رنج ببرد، چپخ و فریاد بزند و شاید دچار حالت غیر شعوری به نظر برسد. موجودیت خون یا مخاط در مواد غایبه امکان پذیر است و کودک میتواند حالت تهوع داشته و استفراغ کند. کودک شاید به درد که میرود و میاید، دچار باشد. اگر فرزندتان یکی از علائم فوق را نشان دهد باید فوراً به خدمات صحتی مراجعه کنید تا کودک تحت مراقبت و تداوی لازم قرار بگیرد.


آیا خواهان معلومات بیشتر هستید؟
 از تماس تان با مرکز صحتی اطفال همیشه از صمیم قلب استقبال میشود. معلومات بیشتر را میتوانید در وبسایت های ذیل نیز بخوانید:

- 1177.se
- Folkhalsomyndigheten.se
- Lakemedelsverket.se

برنامه ملی واکسیناسیون سویدن

واکسین ویروس روتا در برنامه واکسیناسیون سویدن شامل میباشد. در پایین آندسته واکسین هایی ذکر شده اند که بمنظور جلوگیری از امراض خطرناک به تمام کودکان در سویدن عرضه میگرددند.

مرکز صحتی اطفال



مکتب

