



Folkhälsomyndigheten

Virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

Stephan Stenmark
Folkhälsomyndigheten



Från covid-19 till generisk vägledning



Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg

- Arbetet påbörjades i april 2023
 - Publicering (version 1) i början av oktober 2023
 - Projektgruppen Fohm:
 - Elsie Ydring SH-SÖ
 - Lotta Edholm SH-AV
 - Stephan Stenmark SH-AV
 - Inga Zetterqvist SH-AV
 - Olov Aspevall SH-ZA
 - Åsa Björndal MI
 - Emmi Andersson MI
 - Referensgruppen (2 möten)
 - SFVH - Svensk Förening för Vårdhygien
 - SHLF - Svenska Hygienläkarföreningen
 - MAS/MAR-riksförening
 - FKM - Föreningen för klinisk mikrobiologi
 - Smittskyddsläkarföreningen
 - NAG Vårdhygien
 - SILF - Svenska Infektionsläkarföreningen (inbjudna men deltog ej)
 - Senaste version av dokumentet även skickat till utredare på Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket
-

Virusorsakade luftvägsinfektioner

- Likheter i epidemiologi, klinik, diagnostik, övervakning, handläggning, prevention och påverkas av samma skyddsåtgärder

SARS-CoV-2

Vaccin

Antiviral behandling

Influensa

Vaccin

Antiviral behandling och profylax




RSV

Vaccin för äldre och gravida

Monoklonala ab till högriskbarn

Ingen po antiviral behandling


Figur 1. Antal bekräftade fall per vecka, antal nya intensivvårdade (IVA) och antal avlidna fall från vecka 6 2020 till och med aktuell rapportvecka.




Åtgärder för virusorsakade luftvägsinfektioner

- En riktning mot mer lika åtgärder för att motverka smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner


SARS-CoV-2




Influensa




RSV



Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation



- Antiviral behandling:
 - Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp.
 - Rekommenderas till personer med influensasjukdom som kräver slutenvård eller orsakar kraftig allmänpåverkan.
 - **Bör övervägas till personer som insjuknar med symtom förenliga med influensa under pågående slutenvård eller omsorg.**
 - Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp.
- Profylax:
 - Rekommenderas till personer i medicinsk riskgrupp.
 - Bör övervägas till samtliga personer som vårdas på enheter i slutenvård eller omsorg med pågående smittspridning.
 - Kan övervägas till personer i nära kontakt (exempelvis hushållskontakter) med personer som tillhör medicinsk riskgrupp.
- [Behandling och profylax vid influensa – behandlingsrekommendation](#)



Om dokumentet

Syfte

- Att minska sjuklighet och dödlighet av årligen återkommande virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.

Målgrupp

- Chefer och medicinskt ansvariga inom vård- och omsorgsverksamheter i regioner och kommuner samt regionernas smittskydds- och vårdhygienenheter.
 - Vägledningen utgör ett stöd när förebyggande åtgärder och rutiner tas fram, regionalt och lokalt, i dialog med vårdhygienisk expertis.
-

Om dokumentet

- Fokus på virusorsakade luftvägsinfektioner:
 - misstänkt infektion
 - bekräftad infektion
 - vid avsaknad av specifik diagnos.
 - ECDC har sedan feb 2023 ett generiskt dokument. Nu liknande process i hela norden
 - Förebyggande åtgärder för smittspridning i vård och omsorg. Patienter, omsorgstagare och personal
 - Så långt som möjligt samma skrivningar för regional sjukvård som kommunal vård- och omsorg (inte förskola)
-

Om dokumentet

Smittförebyggande åtgärder

- Basala hygienrutiner
 - Eliminera smittrisk när det är möjligt
 - Använd arbetssätt som minskar smittrisker
 - Erbjud vaccination
 - Minska smittrisk med tekniska och fysiska åtgärder
 - Säkerställ diagnostik
-

Om dokumentet

- Riskbedömning för åtgärder vid misstänkt eller konstaterad smitta
 - individens virusmängd
 - avstånd
 - tid
 - förekomst av hosta
 - nedsatt immunförsvar
 - ventilation
 - Riskbedömningen som får avgöra när personalen vid misstänkt och konstaterad smitta kan använda munskydd och bör överväga andningsskydd
-

Om dokumentet

- Avstått från begreppet aerosolgenererande procedurer och skriver istället åtgärder med ökad risk för smittspridning
 - Avstått från begreppet source control och skriver istället om Munskyddsansvändning för att förhindra spridning från smittsam person
-

Tack

Håll dig uppdaterad via vår webbplats,
vårt nyhetsbrev och våra sociala medier.



Folkhälsomyndigheten

www.fohm.se • fohm.se/nyhetsbrev • LinkedIn • Facebook • X