



Folkhälsomyndigheten

# Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

Version 18, gäller från 2021-01-29

För definition av fall av covid-19 hänvisas till [falldefinitionen vid anmälan enligt smittskyddslagen](#). Regionen i samråd med smittskyddsläkare har alltid möjlighet att göra Anpassningar utifrån hur situationen ser ut regionalt.

Efter genomgången infektion är förnyad provtagning inom ett halvår från infektionstillfället i allmänhet inte indikerad. Förnyad provtagning bör oberoende av nyligen genomgången infektion övervägas om det föreligger en misstanke om covid-19 som kräver vård och behandling, vid immunsuppression samt exempelvis inför hälso- och sjukvård, särskilt med aerosolbildande moment.

Viruset kan i det flesta fall påvisas tidigt i infektionsförloppet. Vid bedömning om förnyad provtagning bör man beakta att kvarstående PCR-positivitet finns rapporterat upp till flera månader efter genomgången infektion. För smittfrihetsbedömning, se [Vägledning om smittfrihet](#).

För provtagning i samband med smittspårning se även [Vägledning för smittspårning av covid-19](#).

## Indikation för provtagning

Gäller oberoende av vaccinationsstatus.

- Vid symtom på covid-19
- Vid smittspårning
- Vid eventuell screening. Exempelvis inför inskrivning i omsorgsboende eller slutenvård görs baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild