



Folkhälsomyndigheten

معلومات للأشخاص الذين سيقومون بتلقيح أنفسهم

معلومات مفيدة حول التطعيم ضد كوفيد-19

قبل التطعيم

قبل أعطائك التطعيم عليك مليء أستمارة التصريح الطبي الذي يتضمن معلومات فيما إذا

- قمت بتلقيح نفسك حديثاً، إمّا بتلقيح آخر أو بتلقيح ضد كوفيد-19
- كنت تزف بسهولة، لسبب ما. مع ذلك بإمكانك الحصول على التطعيم، ولكن من المفيد أن نعرف حتى يُمكننا منع الزيف عندما نقوم بوخزك بأبرة التطعيم
- إذا ما أصبت بحساسية شديدة عند حصولك على تطعيمات سابقة.

كيفية التطعيم

ستقوم ممرضة بأعطائك اللقاح باستخدام حقنة في الجزء العلوي من ذراعك. إذا كنت بحاجة إلى التطعيم مرتين، فستحصل على النوع نفسه من اللقاح في كلتا المرتين.

بعد التطعيم

سيستغرق الامر أسبوعاً على الأقل بعد أعطائك التلقيح لكي يتمكّن جسمك من بناء الحماية ضد كوفيد-19. واعتماداً على نوع اللقاح المستخدم، هنالك حاجة إلى عدد مختلف من الجرعات من أجل توفير الحماية الجيدة.

بعد حقن اللقاح من المألوف أن تتألم قليلاً، وتصبح المنطقة حمراء، منتفخة أو تشعر بالحكة على ذراعك. قد يُصاب البعض بحمى لفترة قصيرة، ألم في الرأس و شعور عام بالمرض. تُعتبر كل هذه الاعراض رد فعل طبيعي لجهاز المناعة في الجسم. غالباً ما تكون الأعراض خفيفة وتختفي بعد يوم أو يومين. ان ظهور الحساسية كرد فعل يعدُّ غير مألوف جداً.

إذا كنت تشعر بالتوعك أو القلق بعد التطعيم، يجب عليك الاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية لكي يتسنى لنا التحقق من الأعراض، بغض النظر عما إذا كانت هذه الاعراض مرتبطة بالتطعيم أم لا.

لماذا يجب أخذ التطعيم؟

قد يكون التطعيم ضد كوفيد-19 قادراً على حمايتك من الإصابة الشديدة بالمرض. كما يمكن أن يقلل من خطر نقل العدوى للآخرين.

لمن يتم تقديم التطعيم؟

يتم تقديم اللقاح أولاً للأشخاص الذين يتعرّضون لخطر الإصابة البالغة والخطيرة بالمرض. يتم حالياً تقديم التطعيم ضد كوفيد-19 للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

ان التطعيم ضد كوفيد-19 اختياري

إذا كنت تريد معرفة المزيد قبل اتخاذ القرار، فستجد الحقائق والمعلومات متوفرة على:

- 1177.se
- folkhalsomyndigheten.se
- lakemedelsverket.se
- خط معلومات الادوية: 0771-46 70 10

أستمر بحماية نفسك وحماية الآخرين

يجب على الأشخاص الذين أخذوا التلقيح الاستمرار في اتباع التوصيات وذلك للحد من انتشار العدوى.

- البقاء في المنزل في حالة ظهور الأعراض.
- الحرص على الابتعاد بمسافة عن الآخرين.
- غسل اليدين مراراً.

ستقوم مؤسسات الرعاية الصحية بالإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها إلى مصلحة الادوية. إذا حدث لك آثاراً جانبية بعد التطعيم، يُمكنك الإبلاغ بنفسك على الموقع www.lakemedelsverket.se/rapportera

Vaccination
mot covid-19

