



Folkhälsomyndigheten

إذا كنتِ حاملاً

معلومات حول التطعيم ضد كوفيد-19

في السويد الانتظار مع جميع أنواع التطعيمات إلى ما بعد الأسبوع 12 من الحمل، حتى لو لم تكن اللقاحات تؤدي إلى أي مخاطر. كما تُعتبر الحاجة إلى الحماية من كوفيد-19 أكبر أيضاً خلال الجزء الأخير من فترة الحمل. إذا بدأت بالتطعيم قبل الحمل، يمكنك الحصول على الجرعة التالية طبقاً للفترات المنتظمة العادية.

اللقاحات المضادة لكوفيد-19 آمنة

لا يوجد أي دليل على أن التطعيم ضد كوفيد-19 لديه أي تأثير سلبي على المرأة الحامل أو على الجنين.

- لا يوجد أي خطر متزايد لدى النساء الحوامل للتعرض إلى الآثار الجانبية مقارنة مع الآخرين.
- تشير الدراسات إلى عدم وجود خطر متزايد للتعرض للإجهاد بعد الحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19.

- يمكنك أيضاً تلقي التطعيم ضد مرض كوفيد-19 أثناء فترة الرضاعة.

لا يوجد أي دليل على أن التطعيم ضد كوفيد-19 يعطل الدورة الشهرية أو يؤثر على الخصوبة. وإذا كنتِ تريدين أن تصبحي حاملاً فليس من الضروري الانتظار بعد التطعيم.

من المهم أن تتمتع بصحة جيدة عندما يحين وقت الولادة

من الضروري أن تكوني بصحة جيدة قبل الولادة. لذلك، من المهم بصفقتك حامل أن يتم تطعيمك ضد مرض كوفيد-19. ومن المهم أيضاً أن يتم تطعيم شريكك وأفراد الأسرة الآخرين وأن يكونوا جميعاً في صحة جيدة. يمكنك أيضاً، إذا كان عمرك 18 عاماً أو أكثر، أن تحصل على التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في نفس الوقت الذي تحصلين فيه على التطعيم ضد مرض كوفيد-19.

توصي هيئة الصحة العامة النساء الحوامل بالتطعيم ضد كوفيد-19. عندما تقومين بالحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19 بصفقتك امرأة حامل، فإنك تحمين نفسك من الأمراض الخطيرة وتحمين طفلك أيضاً. يوصى أيضاً بالحصول على اللقاح حتى لو كنتِ قد أصبتِ بكوفيد-19.

سبب توصية النساء الحوامل بالحصول على اللقاح المضاد لكوفيد-19

- تشير الدراسات إلى أن النساء الحوامل أكثر عرضة من الناس الآخرين في نفس العمر للإصابة بالخطيرة بمرض كوفيد-19.
- يزيد مرض كوفيد-19 الشديد خلال الجزء الأخير من فترة الحمل من خطر الولادة المبكرة ويمكن أن يؤدي إلى ولادة الطفل قبل الأوان بعملية قيصرية.
- يزيد مرض كوفيد-19 خلال فترة الحمل من خطر التعرض إلى جلطات دموية وتُسبب الحمل والمرض الخطير الذي يتطلب الحصول على الرعاية المكثفة.

التطعيم ضد كوفيد-19 يحمي الطفل أيضاً

عندما يتم تطعيمك ضد كوفيد-19، تتكوّن الأجسام المضادة التي تحميك من المرض. يمكن أيضاً، لدى النساء الحوامل اللاتي لديهن أجسام مضادة، أن تنتقل الأجسام المضادة إلى الجنين عبر المشيمة خلال الجزء الأخير من فترة الحمل. كما إن التطعيم يحميك أيضاً من المرض بعد الولادة لكي تكوني بصحة جيدة ويمكنك الاعتناء بطفلك.

يمكنك تلقي التطعيم طوال فترة الحمل

اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي تُستعمل في السويد موافق عليها لإعطائها للنساء الحوامل طوال فترة الحمل. ومع ذلك فإنه من المعتاد

يُعرض التطعيم ضد كوفيد-19 على جميع الأطفال في عمر 12 سنة أو أكثر. التطعيم طوعي ومجاني.

يوجد على الموقع الإلكتروني

folkhalsomyndigheten.se المزيد من

المعلومات حول كوفيد-19 بعدة لغات.

ويوجد على الموقع الإلكتروني 1177.se معلومات حول الأماكن التي يمكنك الحصول فيها على التطعيم في المنطقة التي تعيشين فيها.



Vaccination
mot covid-19

