



Till dig som erbjuds vaccin mot mpox

Du erbjuds vaccin mot mpox (tidigare apkoppor) om du har haft nära fysisk kontakt med någon som har mpox, eller om du bedöms ha ökad risk att utsättas för apkoppsviruset.

Vaccin mot mpox

Vaccinet som erbjuds är godkänt för vaccination mot smittkoppor och mpox. Vaccinet innehåller ett försvagat virus som inte kan föröka sig i kroppen och som därmed inte kan sprida eller orsaka en infektion.

Hur vaccinet används

Vaccinet används förebyggande för personer som har stor risk att utsättas för viruset. Det används också för att hindra infektionen eller mildra sjukdomsförloppet hos ovaccinerade personer som har utsatts för viruset. Om en person har utsatts för en smittorisk ger vaccinet bäst effekt om det ges inom fyra dagar, men i vissa fall kan det ges upp till 14 dagar efteråt.

Hur vaccinationen ges

Vaccinationen är gratis och ges som en injektion i armen. Vanligtvis är det två doser med minst 28 dagars intervall som gäller, men i vissa fall räcker det med en dos. Det är din läkare som bedömer hur många doser du behöver.

Om du är vaccinerad mot smittkoppor

Om du tidigare är vaccinerad mot smittkoppor kan du ha ett visst skydd mot mpox och behöver därför endast en dos vaccin. Allmän vaccination mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige.

Vem kan inte ta vaccinet?

Den som är allergisk mot någon komponent i vaccinet ska inte vaccineras. Du kommer att få information av den som ger dig vaccinet.

Andra vaccinationer

Vaccin mot mpox ska inte ges samtidigt som andra vaccin. Det behöver gå minst fyra veckor mellan vaccination med vaccin mot mpox och andra levande försvagade vaccin (till exempel mot mässling och gula febern), och minst två veckor till andra avdödade vaccin (till exempel mot TBE och covid-19).

Biverkningar efter vaccination

Liksom vid andra vaccinationer kan du få lokala symtom som smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället. Feber, huvudvärk och muskelvärk som går över på en eller ett par dagar är också vanliga biverkningar. Om du får allvarliga eller oväntade symtom efter vaccinationen bör du kontakta vården för råd. Uppge att du nyligen vaccinerats mot mpox.

Det är viktigt att alla biverkningar rapporteras för att få ökad kunskap om vaccinationen och dess biverkningar. Du kan även själv rapportera biverkningarna via Läke-medelsverkets webbplats:

www.lakemedelsverket.se/sv/rapportera-biverkningar/lakemedel/misstankt-biverkning-hos-manniska

Om du får symtom på mpox trots vaccination

Om du trots vaccination får symtom på mpox ska du kontakta vården för råd, provtagning och smittspårning. Insjuknande efter vaccination ger oftast mildare symtom än för en ovaccinerad person.