



Folkhälsomyndigheten

VACCINATION MOT INFLUENZA OCH COVID-19, OKTOBER 2023, KURMANJI

## Aşîlêdana li dijî şopa Covid-19

Folkhälsomyndigheten (Dezgeha Tenduristiya Gel) bo hemî kesên 65 salî û mezintir û bo kesên din ên di nav komên xeteriyê de ne pêşniyar dike, daku aşîlêdanê bikin.

### Aşîlêdan belaş e

Folkhälsomyndigheten, derbareyê van tiştan we aghehdar dike:

- Kesên di nav komên xeteriyê de ne, ew ji bo aşîlêdana şopa Covid-19 pêşemîn têne girtin. Ji bo mirovên li komên xeteriyê, aşîlêdan li seranserê welêt belaş e.
- Di heman demê de aşîlêdana dijî grîpa demsalî û Covid-19 tişteki baş e.
- Di vê zivistanê de ihtimal heye, ku hem grîp û hem jî Covid-19 belav bibin. Loma aşîlêdan riya herî baş e ji bo parastina wan kesên ku wan xeter heye ku giran nexweş bikevin.
- Aşîlêdan ji nexweşiyê sedî sed naporêze, lê heger hûn herçend aşî bûbin jî dîsan nexweş bibin hingê enfeksiyonê sivik dike.

### Grûpên rîskê pêşemîn têne girtin

Komên jêrîn ji bo aşîlêdana li dijî grîpê û Covid-19 têne pêşniyarkirin û ji bo alîlêdanê (bê rêzeke taybetî) pêşemîn têne girtin:

- Kesên ku 65 salî yan mezintir in.
- Jinên ducanî yê piştî hefteya 12
- Salmezinên 18 salî û mezintir ên bi nexweşî, bi teşhîs an jî bi şert û mercên jêrîn:
  - Nexweşiya dil û vaskuler (damar) a kronîkî tevî felcê. Ji bo Covid-19 jî hîpertansiyon (tansiyona bilind).
  - Nexweşiya pişikê ya kronîkî, wek KOL û astîma giran an bêstîqrar.
  - Semptom an şert û mercên din ên ku dibin sedema xerabûna fonksiyona pişikê yan kêmbûna hêza kuxikê (mînak, qelewbûna giran, nexweşiyên neuromuskuler (esabiyeta masilê) yan kêmbûna gelek fonksiyonan).
  - Têkçûna kezebê yan gurçikê a kronîkî.
  - Nexweşiya şeker mellîtûs 1 û 2.
  - Li ew mercên ku yan jî ber nexweşiyê, yan jî ji ber dermankirinê, tevî Sendroma Down'ê pergala parastinê bi giranî kêmbûye.

Komên din ên ku dikarin bi taybetî ji bo aşîlêdana Covid-19 bêne hesibandin, ji bilî van komên xeternak ên diyarkirî, mirovên ku ji lêniherîna malê yan jî yên wekî wan hewceyê alîkariya bi çalakiyên di jiyana rojane de ne, û her weha mirovên derveyî teşhîsên li jor, ji ber sedemên din bi tendurustiya wan a girîng astengdar in.

Sedemên din ên weha, dibe ku nexweşiya derûnî, nefsi yan dementia (xirifîn), û her weha karhanîna zirardar a alkolê yan narkotîkayê jî hebe.

Komên jêrîn bo aşîlêdana li dijî îfluensayê têne pêşniyarkirin:

- Zarokên 6 mehî heta 17 salî yên bi nexweşî, teşhîs û şert û mercên li gor lîsteya jorîn ya ji bo salmezinan.
- Têkiliya malbatê, hem zarok û hem jî kesên salmezin, bi wan kesên ku sîstema parastina wan gelekî sist û lawaz e.
- Personelên tenduristiyê û lênerîne yên ku nêzî nexweşan û wergirên lênerîne yên bi xetereya şopa cidî dixebitin, wek mînak xebatên li xaniyên taybetî yên ji bo kal û pîran (SÄBO) û xebatên di lênerîna malê de.

Doktorên dermanker dikarin li ser pêwîstiya aşîlêdanê nirxandineke kesane bikin.