



Folkhälsomyndigheten

VACCINATION MOT INFLUENZA OCH COVID-19, OKTOBER 2023, SERBISKA

Vaksinacija protiv gripa i COVID-19

Zavod za javno zdravlje Švedske preporučuje svim osobama starosti od 65 i više godina i osobama u drugim rizičnim grupama da se vakcinišu.

Vaksinacija je besplatna

Zavod za javno zdravlje Švedske želi da vas obavesti o sledećem:

- Osobe u rizičnim grupama imaju prioritet kada je u pitanju vakcinacija protiv gripa i COVID-19. Za osobe u rizičnim grupama vakcinacija je besplatna u celoj zemlji.
- Moguće je istovremeno se vakcinisati i protiv sezonskog gripa i protiv COVID-19.
- Najverovatnije će i grip i COVID-19 vladati tokom zime. Vakcinacija je najbolji način da se zaštite oni koji su pod povećanim rizikom od ozbiljne kliničke slike.
- Vakcina ne pruža sto posto zaštite, ali ublažava simptome ukoliko do bolesti dođe iako ste vakcinisani.

Prioritet se daje rizičnim grupama

Sledećim grupama se preporučuje vakcinacija protiv gripa i COVID-19 i prioritetne su (bez posebnog redosleda) za vakcinaciju:

- Osobe od 65 ili više godina.
- Trudnice posle 12 nedelje trudnoće.
- Odrasli od 18 godina, pa naviše, sa sledećim bolestima, dijagnozama ili stanjima:
 - Hronične kardiovaskularne bolesti uključujući i moždani udar. Za COVID-19 takođe i povišen krvni pritisak.
 - Hronična bolest pluća, kao što je HOBP i teška ili nestabilna astma.
 - Druge dijagnoze ili stanja koja dovode do smanjene funkcije pluća ili pogoršanog intenziteta kašlja (npr. ekstremna gojaznost, neuromuskularni poremećaji ili višestruki invaliditeti).
 - Hronično otkazivanje jetre ili bubrega.
 - Dijabetes melitus tip 1 i 2.
 - Stanja koja podrazumevaju ozbiljno oslabljen imuni sistem zbog bolesti ili lečenja, uključujući Daunov sindrom.

Druge grupe koje se posebno mogu uzeti u obzir za vakcinaciju COVID-19, pored ovih definisanih rizičnih grupa, jesu osobe kojima je potrebna pomoć oko aktivnosti u svakodnevnom životu od strane servisa kućne nege ili slično, kao i osobe značajno oslabljenog zdravlja iz razloga koji nisu gore navedene dijagnoze.

Takvi drugi razlozi mogu da uključuju psihijatrijske bolesti ili demenciju, kao i zloupotrebu alkohola ili droge.

Vakcinacija protiv gripa se preporučuje za sledeće grupe:

- Deca uzrasta od 6 meseci do 17 godina sa bolestima, dijagnozama i uslovima prema gore navedenom spisku za odrasle.
- Kontakti iz domaćinstava, dece i odrasli, osoba sa ozbiljno oslabljenim imunim sistemom.
- Osoblje u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koje blisko saraduje sa pacijentima i primaocima nege sa povećanim rizikom od teškog oblika gripa, na primer u specijalnom smeštaju za starije osobe (SÄBO) i u službama kućne nege.

Lekar može da napravi individualnu procenu potrebe za vakcinacijom.