



# Syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie. Bakterien kan sitta i könsorganens slemhinna, men även i ändtarmen, i munnen och i svalget. Bakterien kan också finnas i sår eller i utslag på huden som orsakas av bakterien. Syfilis sprids vid oskyddade sexuella kontakter och överförs lätt mellan människor vid vaginala samlag, analsex och oralsex. Syfilis kan överföras via saliv. Bakterien tränger då in i sår eller skador i munhålan slemhinna. Du kan även få syfilis via blod om du använder droger och delar spruta och nål med någon som bär på bakterien.

## Symtom vid syfilis

Du behöver inte få några symtom när du smittats av syfilis. Det kan dröja många år innan sjukdomen ger sig till känna. Om du får tidiga symtom, så kallad primär syfilis, uppträder de ungefär två veckor till tre månader efter att du har fått infektionen. Du kan då få sår på könsorganet eller på stället där bakterien har trängt in genom slemhinnan, till exempel runt ändtarmens öppning eller i munhålan. Såren behöver inte svida eller göra ont. Lymfkörtlar i närheten av såret svullnar ofta upp.

## Testa dig för syfilis

Provtagning för syfilis är gratis eftersom sjukdomen ingår i smittskyddslagen. Du testar dig genom att lämna ett blodprov. Prov kan även tas från eventuella sår där bakterien kan finnas. Bakterien kan upptäckas tidigast fyra veckor efter smittillfället. För att vara säker på att infektionen ska upptäckas i testet kan det behöva gå upp till tre månader efter smittillfället. Testa dig om du misstänker att du har syfilis.

## Behandling

Behandling mot syfilis är gratis. Infektionen behandlas vanligen med penicillininjektioner i en till tre veckor. Efter avslutad behandling tas alltid kontrollprov. Även din sexpartner behöver testas om du bär på bakterien. Har du flera partner behöver alla testas.

## Att tänka på vid syfilis

Du kan få syfilis flera gånger. Syfilissår kan läka av sig själva och infektionen kan vila i kroppen under många år. Du kan få följsjukdomar om infektionen inte blir behandlad. Risken för följsjukdomar minskar om du snabbt kommer under behandling.

Syfilis kan återkomma i så kallade sekundära och tertiära infektionsstadier. Symtomen skiljer sig då från det första stadiet. Vid syfilis i andra stadiet kan du till exempel få fjällande utslag på kroppen, feber och håravfall. Det andra syfilisstadiet uppstår sju till tio veckor efter att det första stadiet har läkt ut. Syfilis i tredje stadiet kan långt senare ge svåra skador på hjärt- och kärlsystemet i kroppen. Även hud och slemhinnor kan skadas, liksom nervsystemet och hjärnan. Skadorna på blodkärlen, nervsystemet och hjärnan kan bli livshotande om du inte får behandling.

Obehandlad syfilis kan överföras till barnet under graviditeten och då ge barnet svåra skador. Under graviditeten ska du som blivande mamma erbjudas ett syfilistest. Syftet är att kunna ge dig behandling och skydda barnet från skador.

