



Folkhälsomyndigheten

برای شما که می خواهید خود را واکسین کنید.

# معلومات مفید در مورد تطبیق واکسین در برابر کووید - ۱۹

## قبل از تطبیق واکسین

قبل از تطبیق واکسین باید یک اظهارنامهٔ صحی را خانه پُری نمایید. در آن باید بنویسید که آیا

- در این اواخر در برابر کووید - ۱۹ واکسین شده اید، و یا هم کدام نوع واکسین دیگر را دریافت نموده اید،
- و یا هم این که آیا بنابر دلایلی دچار خونریزی خفیف می شوید. با وصف آنهم می توان خود را واکسین کرد. اما خوب است تا در این موارد آگاهی حاصل شود تا از خونریزی در پیوند به سوزن زدن، جلوگیری صورت بگیرد و همچنان
- در این مورد نیز معلومات بدست بیاید که آیا در گذشته بعد از تطبیق واکسین، بدن از خود واکنش نشان داده است.

## تطبیق واکسین این چنین صورت می گیرد

واکسین توسط یک پرستار به کمک یک پیچکاری در بازو تان زرق می شود. اگر نیاز باشد دوبار واکسین شوید، هر دو بار عین نوع واکسین را بدست می آورید.

## بعد از تطبیق واکسین

بعد از آن که خود را واکسین کردید حدود یک هفته را در بر می گیرد تا بدن بتواند در برابر کووید - ۱۹ محافظت ایجاد کند. وابسته به این که از کدام نوع واکسین استفاده می شود، برای محافظت خوب به مقدار مختلف (واکسین) نیاز می باشد.

معمولاً بازو پس از سوزن زدن اندکی درد نموده، سرخ می شود، تورم می نمایید و یا هم خارش می کند. ممکن است برخی افراد دچار تب کوتاه مدت، سردردی شده و درگُل احساس مریضی نمایند. اینها همه واکنش های طبیعی است از طرف سیستم دفاعی بدن. این نشانه ها معمولاً خفیف بوده و بعد از چند رو ناپدید می شوند. واکنش های حساسیتی (الرژیک) خیلی غیر معمول می باشد.

اگر بعد از تطبیق واکسین حال تان خوب نیست و یا نگرانی دارید باید با بخش خدمات درمانی تماس بگیرید تا نشانه های وجود شما، قطع نظر از این که آیا آنها با تطبیق واکسین ارتباط دارند و یا نه، بتوانند مورد بررسی قرار بگیرند.

## چرا واکسیناسیون؟

تطبیق واکسین در برابر کووید - ۱۹ می تواند از شما محافظت کند تا شدید مریض نشوید. واکسین همچنان می تواند خطر انتقال عفونت توسط شما به دیگران را نیز کاهش بدهد.

## تطبیق واکسین به کدام افراد ارائه می شود؟

این واکسین در گام نخست به افرادی ارائه می شود که در معرض خطر جدی قرار دارند که شدید مریض شوند. در حال حاضر تطبیق واکسین در برابر کووید - ۱۹ به افرادی ارائه می شود که ۱۸ سال و یا بیشتر از آن عمر دارند.

## تطبیق واکسین در برابر کووید - ۱۹ داوطلبانه می باشد

شما که می خواهید قبل از گرفتن تصمیم در این مورد آگاهی بیشتر حاصل کنید می توانید از جا های ذیل معلومات و اطلاعات را بدست بیاورید:

- 1177.se
- folkhalsomyndigheten.se
- lakemedelsverket.se
- بخش معلومات ادارهٔ محصولات طی: 0771 - 46 70 10

## به محافظت از خود و دیگران ادامه بدهید

شما که خود را واکسین نموده اید، نیاز دارید تا برای جلوگیری از انتشار عفونت هنوز هم به پیروی از توصیه ها ادامه بدهید.

- در صورت بروز نشانه های مرض، در خانه بمانید.
- فاصله با دیگران را حفظ کنید.
- دست های خود را زود زود بشویید.

بخش خدمات درمانی باید از عوارض جانبی مشکوک به ادارهٔ محصولات طی گزارش بدهد. اگر بعد از تطبیق واکسین عوارض جانبی را مشاهده کردید، خود تان نیز می توانید به [www.lakemedelsverket.se/rapportera](http://www.lakemedelsverket.se/rapportera) گزارش بدهید.

Vaccination mot covid-19

