



Folkhälsomyndigheten

برای کسانی که واکسن دریافت می کنند

اطلاعات مفید در مورد واکسن کووید ۱۹

قبل از واکسیناسیون

باید قبل از زدن واکسن فرم اظهارنامه سلامتی را پر کنید که در آن

- در مورد این که آیا به تازگی واکسن، چه واکسن کرونا و چه واکسن دیگری، زده اید یا نه سوال میشود.
- آیا به هر دلیلی به راحتی خونریزی می کنید؟ در این صورت باز هم میتوانید واکسن بزنید ولی دانستن این موضوع کمک می کند که بتوانیم در هنگام زدن واکسن از خونریزی شدید جلوگیری کنیم.
- در واکسن های قبلی واکنش حساسیتی شدیدی نشان داده اید.

واکسیناسیون به این صورت انجام می شود

یک پرستار با استفاده از تزریق سرنگ در بازوی فوقانی شما واکسن شما را می زند. در صورتی که لازم باشد دو بار واکسن بزنید در هر دو نوبت همان نوع واکسن را دریافت خواهید کرد.

بعد از واکسیناسیون

زمانی که واکسن را زدید حداقل یک هفته طول می کشد که بدن در مقابل بیماری کووید ۱۹ ایمن شود. بسته به نوع واکسنی که استفاده می شود تعداد دوزهایی که برای ایجاد ایمنی لازم است متفاوت است.

بعد از تزریق معمولاً ممکن است بازوی فوقانی شما کمی درد کند، قرمز و یا متورم شود و یا خارش داشته باشد. برخی افراد ممکن است تب های کوتاه مدت، سردرد و یا حس ضعف و بیماری عمومی داشته باشند. همه اینها واکنش های طبیعی هستند که از طرف سیستم ایمنی بدن انجام می شوند. این علائم اغلب خفیف هستند و بعد از چند روز از بین میروند. واکنشهای آلرژیک یا حساسیتی بسیار نادر هستند.

در صورتی که احساس ناخوشی می کنید و یا در مورد واکسن نگرانید باید با خدمات بهداشتی و درمانی تماس بگیرید تا علائم شما صرف نظر از این که به واکسیناسیون مرتبط باشد یا خیر بررسی شوند.

برای چه واکسن بزنیم؟

زدن واکسن کووید ۱۹ میتواند از شما در برابر بیماری جدی در اثر این ویروس حفاظت کند. این کار خطر انتقال بیماری به دیگران را هم کاهش می دهد.

واکسن به چه کسانی ارائه می شود؟

به کسانی که در معرض خطر بیشتر و ابتلای شدید تر به بیماری هستند قبل از دیگران واکسن ارائه می شود. در حال حاضر واکسن کووید ۱۹ برای افراد ۱۸ ساله و بالاتر ارائه می شود.

واکسیناسیون بر علیه بیماری کووید ۱۹ اختیاری است

برای کسانی که میخواهند قبل از تصمیم گیری اطلاعات بیشتری کسب کنند میتوانند از منابع زیر کسب اطلاعات کنند.

1177.se •

folkhalsomyndigheten.se •

lakemedelsverket.se

• سازمان اطلاع رسانی در مورد داروها: 0771-46 70 10

همچنان از خود و دیگران مراقبت کنید.

کسانی که واکسن می زنند باید همچنان توصیه های بهداشتی را رعایت کنند تا از گسترش عفونت جلوگیری کنند.

• در صورتی که علائمی دارید در خانه بمانید.

• فاصله خود را با دیگران حفظ کنید.

• دستهایتان را مرتب بشویید.

سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی باید عوارض جانبی مشکوک را به سازمان محصولات دارویی سوئد گزارش دهد. در صورتی که بعد از واکسن زدن دچار عوارض جانبی شوید میتوانید این عوارض را به سایت زیر اعلام کنید: www.lakemedelsverket.se/rapportera

Vaccination
mot covid-19

