



# Problematiskt narkotikabruk i Sverige – en sammanfattning


Enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten beräknades mellan 63 000 och 83 000 personer i Sverige ha ett problematiskt narkotikabruk under perioden 2007–2020.

Antalet är högre än tidigare beräkningar. Mer omfattande åtgärder för att minska detta bruk kan därför vara viktigare än tidigare känt.

## Förekomsten varierade under 2007–2020 men stabiliserades i slutet av perioden

Antalet personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige skattades som lägst till 63 000 och som högst till 83 000 under tidsperioden. År 2007 var det skattade antalet runt 80 000 personer och 2018–2020 låg det relativt stabilt kring 70 000 personer. Osäkerheten i skattningarna gör dock att skillnaden mellan olika år bör tolkas med försiktighet.

Figur. Antal personer med problematiskt narkotikabruk i Sverige år 2007–2020.



## Fler män och större skillnad mellan könen under den senare delen av perioden

Antalet män med problematiskt narkotikabruk skattades genomgående högre än antalet kvinnor. År 2007 var fördelningen mellan könen dock relativt jämn (cirka 41 000 män och 39 000 kvinnor), och fram till 2013 var utvecklingen liknande för båda könen. Sedan minskade

antalet kvinnor och stabiliserades på en lägre nivå, medan antalet män låg kvar på en högre nivå. År 2020 var antalet män och kvinnor cirka 41 000 respektive 30 000 personer. Skillnaden mellan könen tycks alltså vara större under den senare delen av perioden.

## Skattningen är högre än tidigare skattningar

Förekomsten av problematiskt narkotikabruk i vår skattning är högre än tidigare skattningar som rör samma år. Kraftfullare och mer omfattande åtgärder för att minska detta bruk kan därför vara viktigare än tidigare känt. Direkta jämförelser av resultaten försvåras dock av att skattningarna har genomförts med olika metoder.

### Fakta om skattningen

Skattningen som vi genomfört av antalet personer med problematiskt narkotikabruk, inklusive mörkertalet, i Sverige under perioden 2007–2020 utgår från registerdata. Med problematiskt narkotikabruk avses ett återkommande bruk av narkotika som orsakar eller ökar risken för skador för individen. Metoden som använts rekommenderas av den europeiska narkotikamyndigheten EMCDDA och baseras på uppgifter från:

- Patientregistret
- Försäkringskassans register
- Kriminalvårdens register
- Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

### Vad kan kunskapen bidra till?

En fördel med metoden är att den ger en mer heltäckande bild av det problematiska narkotikabruket, och underlättar uppföljning av utvecklingen över tid. Kunskapen kan användas för planering och uppföljning av insatser men också för internationell rapportering och jämförelser på narkotikaområdet. Vidare kan metoden ligga till grund för liknande framtida skattningar.

### Vill du veta mer?

För mer information om undersökningen, läs den fullständiga rapporten på [www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)