



Folkhälsomyndigheten
PUBLIC HEALTH AGENCY OF SWEDEN

فيروس الروتا

عدوى فيروس الروتا هو مرض معدٍ للغاية، ويمكن أن يكون خطيراً على الأطفال الصغار. التطعيم هو الحماية الأكثر فعالية ضد العدوى.

يمكن أن تسبب عدوى فيروس الروتا القيء، والإسهال الشديد الذي يستمر لعدة أيام. قد يفقد الأطفال الصغار الكثير من السوائل ويصابون بالجفاف، وقد يحتاجون في بعض الأحيان إلى الرعاية الطبية في المستشفى. في غالب الأحيان يكون هذا المرض اشد صعوبة على الأطفال دون سن العامين.

بدون التطعيم يصاب جميع الأطفال تقريباً بعدوى فيروس روتا واحد على الأقل قبل بلوغهم سن الخامسة من عمرهم.



يعطى اللقاح كقطرات في الفم وله مذاق حلو.

هكذا يتم التطعيم

قبل التطعيم

أخبر الممرضة في مركز الرعاية الطبية للأطفال (BVC) عن حالة طفلك الصحية في الوقت الحاضر. اشرح الأسئلة وتحدث عن المخاوف التي لديك.

التطعيم

يعطى اللقاح كقطرات في الفم، وهو ذو مذاق حلو. تعطى الجرعة الأولى عندما يكون الطفل في سن الستة أسابيع، والثانية عندما يكون الطفل في سن الثلاثة أشهر. يمكن إعطاء اللقاح في نفس الوقت أثناء إعطاء اللقاحات الأخرى.

بعد التطعيم

قد يصاب الطفل بعد التطعيم بأعراض خفيفة تذكرنا بعدوى فيروس الروتا. لأن اللقاح يحتوي على فيروس روتا مخفّف. قد يصاب الطفل بألم في المعدة، وغازات وألم في بطنه، لكن هذه الأعراض تختفي بعد حوالي اليومين.

ينتشر الفيروس بسهولة

ينتشر فيروس الروتا بسهولة، ويمكن أن ينتشر الفيروس عن طريق اليدين والفم واللهايات ولعب الأطفال يمكن تقليل خطر الإصابة بالمرض ونشر العدوى من خلال غسل اليدين والأسطح الأخرى، لكن لا يمكن إيقاف انتشار العدوى بشكل كامل.

التطعيم يحمي

يوفر لقاح فيروس الروتا حماية جيدة ضد الأمراض الخطيرة. الأطفال الصغار حساسون للجفاف، لذلك فإن توفير الحماية لهم هو امر مهم للغاية خلال السنتين الأولى من عمر الطفل.

SKYDD
FÖR LIVET



هل تريد معرفة المزيد؟

يرحب بك دائماً عند الاتصال بمركز الرعاية الصحية للطفل.
يمكنك أيضاً قراءة المزيد من خلال المواقع الإلكترونية التالية:

- 1177.se
- Folkhalsomyndigheten.se
- Lakemedelsverket.se

فكر بما يلي بعد التطعيم


يمكن أن يسبب اللقاح آثاراً جانبية، تماماً كما هو الحال مع جميع الأدوية. لا يصاب معظم الأطفال بأية أعراض على الإطلاق، لكن يكون البراز لدى البعض منهم سائل القوام وربما يصاب الطفل بألم في المعدة.

احدى آثار اللقاح الجانبية النادرة جدا هي انغلاف او انغماد (tarminvagination) الأمعاء، وهو ما يدعى بالانغماد المعوي حيث يصاب الطفل اثناء ذلك بالتعب، والإرهاق، وألم في المعدة ويصرخ أو يئن من الألم، وقد يبدو الطفل شاردًا. قد يظهر أيضاً دم أو مخاط في البراز وقد يشعر الطفل بالتوعك والغثيان، ويمكن أن يأتي الألم ويغيب. إذا كان طفلك يعاني أي من هذه الأعراض، يجب عليك اللجوء الى الرعاية الطبية على الفور لكي يحصل الطفل على العلاج.

إن احتمال إصابة طفلك بالانغماد المعوي بعد اخذه اللقاح ضد فيروس الروتا يعد احتمالاً ضئيلاً للغاية، ولكن من المهم أن تعرف ردة فعل الطفل. يمكن أن يصاب الطفل بالانغماد المعوي حتى بدون تطعيم الطفل.

اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري هو جزء من برنامج التطعيم السويدي.

مركز الرعاية الطبية للطفل



المدرسة

