



ЗДРАВНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Попълнете една здравна декларация на човек и доза.

Дата на ваксинацията: _____

Единен Граждански Номер (ЕГН): _____

Име: _____

Попълва се от лицето, което ще се ваксинира:

- | | ДА | НЕ |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Имали ли сте някога толкова силна реакция след ваксинация, че да сте се нуждаели от болнично лечение? | Да <input type="checkbox"/> | Не <input type="checkbox"/> |
| 2. Имате ли алергии, които някога са ви причинявали тежки реакции, за които е било необходимо болнично лечение? | Да <input type="checkbox"/> | Не <input type="checkbox"/> |
| 3. Имате ли повишена тенденция към кървене поради заболяване или лечение? | Да <input type="checkbox"/> | Не <input type="checkbox"/> |
| 4. Бременна ли сте? | Да <input type="checkbox"/> | Не <input type="checkbox"/> |
| 5. Ваксинирани ли сте за нещо през последните 7 дни? | Да <input type="checkbox"/> | Не <input type="checkbox"/> |

Instruktion till dig som vaccinerar gällande fråga 1-5

Om personen svarat JA på fråga 1 och/eller 2: rådgör med en läkare.

Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning. Alternativt läs mer på:

janusinfo.se

Om personen svarat JA på fråga 4: alla gravida erbjuds vaccination mot covid-19. Vaccinen som används är mRNA vaccin (Comirnaty eller, från 31 års ålder Modernas vaccin Spikevax). Gravida kan erbjudas de anpassade mRNA-vaccinen som påfyllnadsdoser. Gravida under 35 år och utan riskfaktorer rekommenderas vaccination efter v. 12. Gravida som är 35 år och äldre, samt gravida oavsett ålder som har ett BMI > 30 vid inskrivning i mödravården eller har en annan riskfaktor kan vid behov erbjudas vaccination före v. 12.

Om personen svarat JA på fråga 5: Samtliga vaccin mot covid-19 kan kombineras med standarddos influensavaccin. Minst sju dagars intervall skall hållas mellan vaccinationer med Nuvaxovid och förstärkta influensavaccin. Samtidig (eller inom en veckas) administration av annat vaccin med vaccin mot covid-19 kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. Detta bör beaktas vid bedömning om eventuell samvaccination för av sköra personer. Samvaccination/vaccination inom 7 dagar går bra för de flesta personer med de flesta vaccin. Några kombinationer skall dock särskilt undvikas eller bedömas, vid behov se sidan nedan på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19

Nedan ifylls av vaccinationsmottagningen:

Covid-19-vaccin namn: _____

Dos 1 Dos 2 Dos 3 Dos 4 Dos 5

Batch-/lotnummer: _____

Vaccinet har getts i:

Höger arm

Vänster arm

Ev. annan lokalisering för administrering: _____

Ev. kommentar: _____

Vaccinatörens namn: _____

Signatur: _____

Vårdgivare: _____

Mottagning/enhet: _____



Folkhälsomyndigheten