



# La blennorragie

La blennorragie ou gonorrhée est causée par une bactérie transmise sexuellement qui se trouve le plus souvent dans le conduit urinaire. Elle peut également apparaître dans le rectum ou dans la gorge, chez les hommes comme chez les femmes. Chez les femmes, cette bactérie peut également se trouver dans la muqueuse du vagin.

La blennorragie se transmet le plus souvent lors de rapports vaginaux, anaux ou oraux non protégés. Même si ce n'est pas très fréquent, la blennorragie peut également se transmettre lors de masturbation réciproque, par contact direct avec une muqueuse contaminée. Il suffit que les doigts touchent la muqueuse contaminée pour qu'ils contaminent à leur tour la muqueuse saine. On peut aussi contracter une blennorragie en partageant des jouets sexuels avec quelqu'un.

## Les symptômes de la blennorragie

La blennorragie est très contagieuse et ne donne pas forcément de symptômes. Puisqu'il n'y a pas de symptômes, vous pouvez contaminer votre partenaire sexuel. De même, vous pouvez contracter la blennorragie de votre partenaire sans le savoir. Lorsque l'infection conduit à des symptômes, il peut s'écouler de deux à sept jours après la contamination avant que vous ne les ressentiez. Ces symptômes sont le plus souvent des pertes provenant du conduit urinaire et des brûlures lorsque vous urinez. Si l'infection se situe dans la gorge ou le rectum, les symptômes peuvent être légers, voire même pas du tout ressentis. La blennorragie peut également parfois causer une inflammation des articulations.

## La détection de la blennorragie

Le test de la blennorragie est gratuit puisque la maladie est couverte par la loi sur la protection contre les maladies infectieuses. Pour la mettre en évidence, on analyse un échantillon d'urine ou un prélèvement de bactéries effectué dans le conduit urinaire. Pour les femmes, on effectue en outre un prélèvement dans le col de l'utérus. Si vous avez eu des rapports oraux ou anaux non protégés, il est recommandé de procéder à des prélèvements de la gorge et du rectum.

Faites-vous tester si vous soupçonnez que vous avez contracté une blennorragie. Toutefois il peut être nécessaire d'attendre plusieurs jours, jusqu'à une semaine, après la

contamination pour que le test révèle une blennorragie. C'est pourquoi vous devez peut-être attendre quelques jours après avoir eu des rapports non protégés avant de faire le test.

## Le traitement de la blennorragie

Le traitement de la blennorragie est gratuit. Il est à base d'antibiotiques. Il est primordial d'éviter tout rapport sexuel pendant le traitement. Il sera en outre nécessaire de faire de nouveaux prélèvements après la fin du traitement pour vérifier que la bactérie a bien disparu avant d'avoir à nouveau des rapports sexuels. En effet, cette bactérie est parfois résistante et difficile à éliminer. Il faudra alors peut-être utiliser un autre type d'antibiotique. Votre partenaire doit, lui aussi, se faire tester. Si vous avez plusieurs partenaires sexuels, ils doivent tous se faire examiner et traiter s'il est constaté qu'ils sont infectés.

## Pensez-y en cas de blennorragie

Vous pouvez contracter la blennorragie plusieurs fois. Vous risquez certaines séquelles si elle n'est pas traitée. Le risque de séquelles diminue si vous vous faites traiter rapidement. Les femmes peuvent avoir une inflammation des trompes et les hommes, une épididymite. Une blennorragie non traitée peut affecter vos possibilités d'avoir des enfants et vous rendre stérile. La bactérie peut aussi passer dans le sang et causer une septicémie et une inflammation des articulations, par exemple dans un genou.

