



# Neuvoja vanhemmille äkillisessä välikorvatulehduksessa

Lasten korvatulehdus on erittäin tavallinen ja useimmissa tapauksissa vaaraton infektio, jonka useimmiten aiheuttavat bakteerit. Useimpien lasten infektio paranee ilman antibioottihoitoa. Tietyissä tapauksissa vaaditaan antibioottihoitoa ja silloin useimmiten ”tavallisella” penisilliinillä. Kipulääkettä voidaan tarvita muutaman vuorokauden ajan riippumatta siitä, onko lapsi saanut antibiootteja vai ei.

## Hoito

Antibiootteja ei suositella 1–12-vuotiaille lapsille, joilla on äkillinen välikorvatulehdus. Jos lapsesi on alle yhden vuoden tai yli kaksitoistavuotias ja hänellä on varmasti korvatulehdus, lääkäri antaa penisilliiniä.

Alle kaksivuotiaiden lasten molemminpuolinen korvatulehdus hoidetaan myös penisilliinillä, kuten kaikki korvatulehdukset, joissa tärykalvo on puhjennut. Joskus lääkäri voi kirjoittaa reseptin, joka voidaan noutaa myöhemmin, jos lapsi ei ole tullut parempaan kuntoon parissa päivässä. On tärkeää huomioida huonontuneen tilan merkit tai paranemista koskevat ongelmat huolimatta siitä, hoidetaanko lasta antibiooteilla vai ei.

## Ota uudelleen yhteyttä:

- Jos kehittyä turvotusta tai punoitusta korvan taakse tai jos korva alkaa sojottaa ulospäin.
- Kunnon huonontuessa, mihin liittyy korkea kuume, lisääntynyt särky tai yleistilan muutos.
- Jos korva alkaa vuotaa (tai tässä tapauksessa nouda ja anna antibiootit aikaisemmin kirjoitetun reseptin mukaisesti). Sama koskee kahden, kolmen vuorokauden jälkeen jatkuvaa korvasärkyä tai kuumetta.

Kipua lievittäviä lääkkeitä, esim. parasetamolia, voidaan antaa lapselle tarpeen vaatiessa. Jos lapsi on yli kuuden kuukauden ikäinen, voidaan antaa myös ibuprofeenia. Lapsen tulee olla oireeton ja kuumeton vähintään vuorokauden ajan ennen esikouluun/kouluun menoa.

## Seuranta

Jos lapsellasi on korvatulehdus toisessa korvassa ja toinen korva on terve, ei tarvita jälkitarkastusta (huolimatta siitä, onko lapsi saanut antibiootteja vai ei).

Alle neljävuotiaat lapset pitää tarkastaa kolmen kuukauden päästä, jos heillä on molemminpuolinen korvatulehdus tai korvatulehdus toisessa korvassa ja nestettä tärykalvon takana toisessa korvassa.

Vanhemmille lapsille ja aikuisille, joilla on molemminpuolisia vaivoja, suositellaan tarkastusta kolmen kuukauden jälkeen ainoastaan silloin, jos kuulo on edelleen huonontunut. Ota huomioon, että on tavallista, että kuulo on huonontunut parin viikon ajan korvatulehduksen jälkeen.

Ota aina uudelleen yhteyttä tutkimusta varten muiden oireiden ilmaantuessa (esimerkiksi särky, voimakas lukkiutumisen tai paineen tunne, korvan vuotaminen, tasapainohäiriöt).

Hakeudu aina lääkäriin, jos epäilet, että lapsesi kuulee huonosti huolimatta siitä, oletko havainnut korvatulehduksista vai et.

## Täytä vastaanotolla ja rastita oikeat vaihtoehdot:

Lapsella on tänään korvatulehdus

- vasemmassa korvassa
- oikeassa korvassa
- toinen korva terve
- nestettä toisessa korvassa
- Tarkastusta ei tarvita, jos kaikki on hyvin
- Tarkastusta suositellaan 3 kuukauden päästä

Lapsi on ollut lääkarilla

Päivämäärä

Ota yhteyttä/varaa aika

Puhelin