



Mycoplasma genital

El micoplasma genital es una bacteria que se puede transmitir por vía sexual durante el coito vaginal o anal y por medio del contacto de las mucosas, y puede causar una infección en los órganos genitales. Produce síntomas parecidos a los de la clamidia pero también puede no presentar síntoma alguno. Entre los pacientes examinados en los consultorios de infecciones de transmisión sexual, la clamidia se da aproximadamente el doble de veces que esta infección.

El micoplasma genital se puede encontrar en la uretra, la vagina, el recto y a veces puede producir infecciones más complicadas como la salpingitis en las mujeres y la epididimitis en los hombres. En casos aislados puede provocar oftalmia. No aparece en la garganta.

Síntomas del micoplasma

Los síntomas son como los de la infección de clamidia. El micoplasma genital puede producir molestias en la uretra en hombres y mujeres -escozor al orinar, picor o sensación de malestar en la uretra y a veces flujo. Las mujeres también pueden segregar flujo de la vagina, hemorragias entre las menstruaciones y dolor en el abdomen. Los hombres pueden tener una epididimitis con inflamación y dolor en la mitad del escroto.

Pruebas

La toma de muestras para analizar el micoplasma genital se recomienda solamente en caso de presentar síntomas y signos de infección. No antes de una semana del momento del contagio es posible comprobar la presencia de la bacteria en una prueba. Los hombres pueden dejar una muestra de orina y las mujeres una muestra de orina combinada con muestra de la vagina y del cuello uterino. También se puede tomar una muestra del recto si has practicado coito anal y en caso de una oftalmia se puede tomar una muestra del ojo.

Tratamiento

La infección de micoplasma genital se trata con antibióticos recetados por el médico. El tratamiento que normalmente se hace contra la clamidia no es en general efectivo contra el micoplasma genital. El tratamiento no es gratuito porque la enfermedad no está incluida en la ley de protección contra enfermedades infecciosas. Es importante que no tengas relaciones sexuales ni contacto próximo de las mucosas con nadie durante el tratamiento. La prueba de control puede hacerse de tres a cuatro semanas después de terminado el tratamiento. Si aún tienes molestias una vez terminado el tratamiento debes dejar siempre una muestra para hacer una prueba de control. Sucede que el tratamiento no es efectivo y entonces hay que usar otro antibiótico.

Si tienes una pareja fija, él o ella deben hacerse una prueba y recibir tratamiento, si no, corres el riesgo de contagiarte nuevamente una vez terminado el tratamiento.

A tener en cuenta con el micoplasma

Es posible tener una infección de micoplasma genital varias veces.

El micoplasma genital se ha comprobado en infecciones del útero y de las trompas de Falopio pero es menos común que en el caso de una infección de clamidia. La bacteria también se ha encontrado en la epididimitis en los hombres. Como los conocimientos sobre esta enfermedad venérea son bastante recientes, no se ha determinado aún si la infección puede conducir a tener dificultades para tener hijos y en ese caso en qué grado.

