



Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet för barn (HSLF-FS 2016:51)

Detta är en konsoliderad föreskrift som tagits fram i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. [PDF:er av de tryckta föreskrifterna finns på vår webbplats.](#) Ändringar har förts in till och med **HSLF-FS 2020:25**.

Tillämpningsområde

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid vaccination enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255).

2 § Av 2 kap. 3 f § smittskyddslagen (2004:168) framgår att regionen och huvudmannen för elevens utbildning ska erbjuda de vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Utöver det som anges i första stycket finns det bestämmelser om regionens ansvar i 6 § lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, samt i 5 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Av dessa författningar framgår det att vad som anges där om regionens ansvar även gäller för en kommun som inte ingår i en region. (HSLF-FS 2020:25).

3 § Har upphört att gälla. (HSLF-FS 2019:17).

Ålder och årskurs

4 § I barnhälsovården ska beräkningen av ålder för vaccination utgå från ett barns födelsedatum, även om barnet är för tidigt fött.

I elevhälsan ska vaccination ges i de i 5 § angivna årskurserna.

Vaccinationsschema

5 § Barn ska erbjudas vaccination enligt följande schema: (HSLF-FS 2019:17).

| Ålder | Barnhälsovård | | | | | | Elevehälsa | | |
|------------------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|-------|------------|---------|-------|
| | 6 veckor | 3 mån | 5 mån | 12 mån | 18 mån | 5 år | | | |
| Årskurs | | | | | | | 1-2 | 5 | 8-9 |
| Rotavirus | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3* | | | | | | |
| Difteri | | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3 | | Dos 4 | | | Dos 5 |
| Stelkramp | | | | | | | | | |
| Kikhosta | | | | | | | | | |
| Polio | | | | | | | | | |
| Haemophilus influenzae typ b | | | | | | | | | |
| Pneumokocker | | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3 | | | | | |
| Mässling | | | | | Dos 1 | | Dos 2 | | |
| Påssjuka | | | | | | | | | |
| Röda hund | | | | | | | | | |
| Humant papillom virus | | | | | | | | Dos 1+2 | |

(HSLF-FS 2020:25).

* Gäller för vaccin mot rotavirus som ska ges i tre doser.

Allmänna råd

Vid vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta bör dos 1–4 ges som fulldosvaccin och dos 5 ges med reducerad antigenhalt.

6 § Barn som inte har vaccinerats enligt vaccinationsschemat i 5 § ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn upp till 18 års ålder.

Begränsningar och tidpunkter för vaccination

7 § Vid vaccination enligt vaccinationsschemat i 5 § och vid kompletterande vaccination enligt 6 § ska följande begränsningar och tidpunkter tillämpas:

- Vaccination mot humant papillomvirus ska erbjudas barn födda 2009 och senare i årskurs 5. För barn födda 2008 och tidigare gäller att vaccinationen endast ska erbjudas till flickor.
- Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker ska endast erbjudas barn upp till 6 års ålder.
- Första dosen vaccin mot rotavirus ska ges före 12 veckors ålder och den andra dosen ska ges före 16 veckors ålder.
- Andra dosen vaccin mot rotavirus får ges tidigast 4 veckor efter den första dosen. Om vaccinationen ges i tre doser får den tredje dosen vaccin mot rotavirus ges tidigast 4 veckor efter den andra dosen.
- Första dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges från 2,5 månaders ålder.
- Andra dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b respektive pneumokocker får ges tidigast 6 veckor efter den första dosen och den tredje dosen får ges tidigast 6 månader efter den andra dosen.
- Fjärde dosen vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio får ges tidigast 3 år efter den tredje dosen.
- Femte dosen vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta får ges tidigast 5 år efter den fjärde dosen.

– Första dosen vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund får ges från 12 månaders ålder.
(HSLF-FS 2020:25).

Undantagsbestämmelse

8 § Folkhälsomyndigheten kan medge undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter.

-
1. Dessa föreskrifter⁴ träder i kraft den 1 augusti 2020.
 2. Under perioden 1 augusti 2020 till 31 juli 2022 får vaccination mot humant papillomvirus även erbjudas barn födda 2009 och senare i årskurs 6.