



Folkhälsomyndigheten

# Resultat i tabellform

Bilaga 1 till "Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2021"



# Innehåll

Resultat för indikatorer som ingår i årsrapporten .....	3
Målområde 1 – Det tidiga livets villkor .....	4
Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning .....	4
Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö.....	5
Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter .....	6
Målområde 5 – Boende och närmiljö .....	9
Målområde 6 – Levnadsvanor .....	10
Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet.....	12
Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård .....	13
Hälsa.....	15

# Resultat för indikatorer som ingår i årsrapporten

I denna bilaga finns tabeller som visar resultaten för indikatorerna i årsrapporten utifrån ett nuläge baserat på senast tillgänglig data samt utvecklingen över tid, både inom och mellan grupper. Tabellerna är uppdelade utifrån det folkhälsopolitiska ramverkets åtta målområden samt ett separat hälsoavsnitt. Varje indikator redovisas utifrån kön, ålder, utbildningsnivå och födelse land i den mån information finns tillgänglig. På [Folkhälsomyndighetens webbplats](#) finns mer information om indikatorerna.

Där det är möjligt redovisas åldersstandardiserade siffror. Ålderstandardisering har gjorts för att justera för effekten av att åldersfördelningen kan vara olika mellan befolkningsgrupper och över tid. Till exempel finns det en större andel äldre både i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå och i gruppen födda i övriga Norden (ej Sverige) jämfört med övriga utbildningsgrupper och övriga grupper av födelse lander, vilket påverkar hälsan i dessa grupper.

Pilarna i tabellerna visar utvecklingen över tid, både inom respektive grupp och ojämlikhet mellan två grupper. Uppåtgående pil visar på en ökning, nedåtgående pil visar på en minskning och horisontell pil visar att det inte har skett någon signifikant utveckling under perioden. Avsaknad av pil betyder att analys inte har utförts, vilket kan ha flera olika anledningar, som till exempel att antalet personer är otillräckligt för att möjliggöra analys.

Förändringen över tid inom respektive grupp kan vara signifikant ökande eller minskande trots att utvecklingen gått både upp och ner under perioden. I dessa fall är pilens riktning oftast ett utslag av utvecklingen under den senare delen av perioden. Färgen på pilen visar i sin tur om förändringen har varit positiv eller negativ ur ett hälsoperspektiv under perioden. Grön pil betyder att förändringen har varit positiv och röd pil betyder att förändringen har varit negativ.

Förändring över tid vad gäller ojämlikhet mellan två grupper visas endast för utbildningsnivå. Här visar pilarna en eventuell ökning eller minskning av ojämlikheten mellan en grupp och referensgruppen, eftergymnasial utbildningsnivå.

I metodbeskrivningen i bilaga 3 finns information om hur analyserna har utförts.

## Målområde 1 – Det tidiga livets villkor

I dagsläget redovisas ingen indikator under målområde 1 eftersom det saknas färdigställda indikatorer. Indikatorer av relevans för det tidiga livets villkor finns även under andra målområden, exempelvis redovisas under målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter, indikatorn Barn i hushåll med låg ekonomisk standard och under målområde 8 – En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, redovisas vaccin till barn under två år och HPV-vaccin till äldre barn.

## Målområde 2 – Kompetenser, kunskaper och utbildning

Tabell 2a. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet inom 4 år (andelar i procent), fördelat på kön och föräldrarnas utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020 för gymnasiebehörighet och 2015–2020 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Flickor	Pojkar	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Gymnasiebehörighet	86	87	85	51	81	93
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	→
Ojämlighet mellan grupper				↗	↗	Jämförelsegrupp
Gymnasieexamen inom fyra år	71	75	68	37	68	81
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper				→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 2b. Elever med behörighet till gymnasiet respektive slutbetyg från gymnasiet inom 4 år (andelar i procent), fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020 för gymnasiebehörighet och 2015–2020 för gymnasieexamen.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Gymnasiebehörighet	86	90	86	78	58
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	↘
Gymnasieexamen inom fyra år	71	78	70	60	36
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Skolverket. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

## Målområde 3 – Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö

Tabell 3.1a. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på kön och ålder, 2019.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	25–34	35–44	45–54	55–64
Sysselsättning	85	82	87	82	89	89	78

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.1b. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2019.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Sysselsättning	85	61	84	89

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.1c. Sysselsättning i befolkningen (andelar i procent), 25–64 år, fördelat på födelse land, 2019.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Sysselsättning	85	89	79	82	65

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 3.2a. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften\*\* (andelar i procent), 15–74 år, fördelat på kön och ålder, 2019.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74
Långtidsarbetslöshet	0,8	0,8	0,9	–	0,5	0,9	1,1	1,3	–

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

\*\* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Tabell 3.2b. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften\*\* (andelar i procent), 25–74 år, fördelat på utbildningsnivå, 2019.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Långtidsarbetslöshet	0,9	3,3	0,9	0,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

\*\* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

Tabell 3.2c. Långtidsarbetslöshet\* i arbetskraften\*\* (andelar i procent), 15–74 år, fördelat på födelseland, 2019.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Långtidsarbetslöshet	0,8	0,4	–	1,4	3,5

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Med långtidsarbetslöshet menas en sammanhängande arbetslöshet som varat i minst 12 månader.

\*\* I arbetskraften ingår endast den arbetsföra befolkningen, det vill säga människor som arbetar eller skulle kunna tänkas arbeta om förutsättningarna varit annorlunda, till exempel arbetslösa och tillfälligt sjukskrivna. De som inte tillhör arbetskraften är bland annat pensionärer, heltidsstuderande, intagna på anstalt och personer med sjuk- eller aktivitetsersättning.

## Målområde 4 – Inkomster och försörjningsmöjligheter

Tabell 4.1a. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på kön och utbildningsnivå, 2018.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Ekonomisk standard	282,4	279,0	285,7	220,0	274,8	308,8

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2018 års prisnivå.

Tabell 4.1b. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, fördelat på ålder, 2018.

Indikator	0–14	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Ekonomisk standard	228,0	255,7	256,1	314,6	229,3	172,9

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2018 års prisnivå.

Tabell 4.1c. Ekonomisk standard\* (tusental kronor), medianvärden, 25–64 år, fördelat på födelse land, 2018.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Ekonomisk standard	282,4	298,6	288,4	247,0	197,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Ekonomisk standard definieras som ekvivalerad disponibel hushållsinkomst, det vill säga summan av hushållsmedlemmarnas inkomster inklusive kapitalinkomster, efter det att skatt och andra negativa transfereringar dragits av, dividerat med en ekvivalensskala som tar hänsyn till hushållets storlek och sammansättning. Med detta mått antas alla personer inom ett hushåll ha samma ekonomiska standard. Belopp anges i fasta priser enligt 2018 års prisnivå.

Tabell 4.2a. Vuxna med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 20 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2018 samt utvecklingen 2011–2018. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	20–29	30–44	45–64	65–84	85–
Låg ekonomisk standard	13	14	12	16	14	10	13	27
Utveckling över tid	↗	↗	↘	↘	↘	↗	↗	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.2b. Vuxna med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2018 samt utvecklingen 2011–2018. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Låg ekonomisk standard	13	27	12	7,7
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	↗	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.2c. Vuxna med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 20 år och äldre, fördelat på födelseland, 2018 samt utvecklingen 2011–2018. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Låg ekonomisk standard	13	9,7	20	21	37
Utveckling över tid	↗	↗	↗	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.3a. Barn med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på ålder, 2018 samt utvecklingen 2011–2018.

Indikator	Totalt	0–4	5–9	10–14	15–19
Låg ekonomisk standard	19	22	20	18	17
Utveckling över tid	→	↗	↗	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

Tabell 4.3b. Barn med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2018 samt utvecklingen 2011–2018.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Låg ekonomisk standard	19	67	23	12
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.



Tabell 4.3c. Barn med låg ekonomisk standard\* (andelar i procent), 0–19 år, fördelat på födelse-land, 2018 samt utvecklingen 2011–2018.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Låg ekonomisk standard	19	15	36	30	61
Utveckling över tid	→	↗	↘	↘	↗

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Låg ekonomisk standard definieras som att hushållets ekonomiska standard är lägre än 60 procent av medianvärdet för riket. För definition av ekonomisk standard se tabell 4.1a-c.

## Målområde 5 – Boende och närmiljö

Tabell 5.1a. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Störd sömn av trafikbuller*	3,4	3,4	3,3	4,4	2,5	3,5	3,3
Avstått att gå ut ensam av rädsla	28	42	14	33	25	25	32
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 5.1b. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Störd sömn av trafikbuller**	3,2	5,0	3,1	2,7
Avstått att gå ut ensam av rädsla	27	29	29	25
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 5.1c. Problem i boende och närmiljö (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelse-land, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Störd sömn av trafikbuller*	3,4	2,5	5,5	5,1	7,9
Avstått att gå ut ensam av rädsla	28	28	33	29	25
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

## Målområde 6 – Levnadsvanor

Tabell 6a. Levnadsvanor (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Riskkonsumtion av alkohol	16	12	20	21	14	17	11
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↘	→	↗	↗
Daglig tobaksrökning	6,8	6,7	6,6	4,2	6,0	8,4	7,9
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Cannabisanvändning*	3,0	2,0	4,1	8,2	4,0	0,8	0,2
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Fysisk aktivitet ≥150 min/vecka**	66	66	67	72	70	66	56

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\* Indikatorn finns med från 2016 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 6b. Levnadsvanor (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Riskkonsumtion av alkohol	15	15	17	15
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Daglig tobaksrökning	7,2	16	8,5	4,0
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Cannabisanvändning**	2,2	1,9	2,3	2,4
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Fysisk aktivitet ≥150 min/vecka***	65	50	63	73

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\*\* Indikatorn finns med från 2016 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 6c. Levnadsvanor (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Riskkonsumtion av alkohol	16	18	19	9	7
Utveckling inom resp. grupp	→	↘	↗	→	→
Daglig tobaksrökning	6,8	5,8	13	10	10
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Cannabisanvändning*	3,0	3,1	0,1	2,9	2,8
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	↗	↗
Fysisk aktivitet ≥150 min/vecka**	66	70	61	57	45

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor?", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\*Cannabisanvändning avser senaste 12 månaderna.

\*\* Indikatorn finns med från 2016 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

## Målområde 7 – Kontroll, inflytande och delaktighet

Tabell 7.1a. Sociala interaktioner (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Svårt att lita på andra	29	28	30	45	29	24	20
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Utsatt för kränkande bemötande eller behandling*	19	24	15	30	21	19	9
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	↘	↗	↘	→	→
Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld**	6,6	6,5	6,9	10	6,6	6,4	3,6
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	→	↘	→	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Utsatt för kränkande bemötande eller behandling avser senaste 3 månaderna.

\*\* Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1b. Sociala interaktioner (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Svårt att lita på andra	26	40	30	20
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Utsatt för kränkande bemötande eller behandling**	18	18	18	19
Utveckling inom resp. grupp		↗	→	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld***	6,0	7,5	6,4	5,9
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Utsatt för kränkande bemötande eller behandling avser senaste 3 månaderna.

\*\* Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

Tabell 7.1c. Sociala interaktioner (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Svårt att lita på andra	29	25	26	42	45
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘
Utsatt för kränkande bemötande eller behandling*	19	19	16	22	23
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	→	→	↘
Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld**	6,6	6,0	6,7	8,1	9,5
Utveckling inom resp. grupp	→	→	↗	↗	→

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Utsatt för kränkande bemötande eller behandling avser senaste 3 månaderna.

\*\* Utsatt för fysiskt våld eller hot om våld avser senaste 12 månaderna.

## Målområde 8 – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tabell 8.1. Barn födda 2017 som vid två års ålder är vaccinerade\* mot sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammet (andelar i procent), 2019.

Indikator	Totalt
Difteri	97,3
Stelkramp	97,3
Kikhosta	97,3
Polio	97,3
Hib	97,2
Pneumokocksjukdom	97,0
Hepatit B	97,2
Mässling, påssjuka och röda hund (MPR)	97,1

Källa: Barnhälsovården (datainsamlingen sker aggregerat och kan därför inte redovisas uppdelat per kön).

\* Vaccinerade med tre doser mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib, Pneumokocksjukdom och hepatit B samt med en dos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR).

Tabell 8.2. Flickor födda 2007 som är vaccinerade med HPV-vaccin (andelar i procent), vaccinationsdatum till och med 2020-06-30.

Indikator	Minst en dos	Minst två doser
HPV-vaccin	87,4	82,0

Källa: Nationella vaccinationsregistret

Tabell 8.3a. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020\*. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Avstått tandvård av ekonomiska skäl	10	10	10	6,7	14	11	8,4
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	→

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Frågan ingick ej i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.3b. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020\*\*. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Avstått tandvård av ekonomiska skäl	11	18	13	8,7
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Frågan ingick ej i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

Tabell 8.3c. Avstått tandvård av ekonomiska skäl trots behov (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelseland, 2020 samt utvecklingen 2006–2020\*.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Avstått tandvård av ekonomiska skäl	10	7,8	13	18	21
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	↘

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Frågan ingick ej i enkäten 2015 och 2016. Trendanalysen är baserad på information från övriga år.

## Hälsa

Tabell 9.1a. Återstående medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på kön och utbildningsnivå, 2019. Utbildningsnivå redovisas endast för inrikes födda.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	För-gymnasial	Gymnasial	Efter-gymnasial
Återstående medellivslängd vid födseln	83,1	84,7	81,3	–	–	–
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder	53,6	55,1	52,0	50,1	53,4	56,1

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.1b. Återstående medellivslängd (år kvar att leva), fördelat på födelse land, 2015/2019 (femårsmedelvärde).

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder	53,1	53,1	51,3	53,4	54,7

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2a. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64
Förtida dödlighet	153	121	185	40	66	307
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2b. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 25–64 år, fördelat på utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Förtida dödlighet	179	313	199	111
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	↗	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.2c. Förtida dödsfall (antal per 100 000), 15–64 år, fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Förtida dödlighet	153	158	203	142	114
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), ursprungligen Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.3a. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på kön och ålder, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	16–29	30–44	45–64	65–84
Bra allmänt hälsotillstånd	73	72	76	82	82	72	59
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↘	↗	↗	→
Psykiskt välbefinnande*	87	86	87	81	86	88	90
Ängslan, oro eller ångest	41	49	33	54	43	37	33
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗
Stress	14	18	11	25	17	12	5,0
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	→	→
Övervikt och fetma	52	45	57	29	46	63	62
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.



Tabell 9.3b. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 25–84\* år, fördelat på utbildningsnivå, 2020 samt utvecklingen 2006–2020. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Bra allmänt hälsotillstånd	72	65	70	79
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Psykiskt välbefinnande**	88	82	87	89
Ängslan, oro eller ångest	39	40	40	38
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Stress	13	14	13	13
Utveckling inom resp. grupp		→	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Övervikt och fetma	56	63	61	47
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	↗	Jämförelsegrupp

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Åldersgruppen 65–84 år innehåller endast personer 65–74 år 2006–2009. Från 2010 och framåt innehåller åldersgruppen personer 65–84 år.

\*\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 9.3c. Självskattad hälsa eller ohälsa (andelar i procent), 16–84 år, fördelat på födelse land, 2020 samt utvecklingen 2006–2020.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Bra allmänt hälsotillstånd	73	74	61	70	77
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	↗	↗
Psykiskt välbefinnande*	87	87	87	82	84
Ängslan, oro eller ångest	41	40	36	47	44
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	→
Stress	14	14	7,4	21	18
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↘
Övervikt och fetma	52	51	63	54	50
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	→	→	↗

Källa: Nationella folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor", en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

\* Indikatorn finns med från 2018 års enkät varför utvecklingen över tid ej finns med.

Tabell 9.4a. Barn och unga med psykosomatiska besvär (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och ålder, 2017/18.

<b>Indikator</b>	<b>Flickor 11 år</b>	<b>Flickor 13 år</b>	<b>Flickor 15 år</b>	<b>Pojkar 11 år</b>	<b>Pojkar 13 år</b>	<b>Pojkar 15 år</b>
Psykosomatiska besvär	41	52	62	30	28	35

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.4b. Barn och unga med psykosomatiska besvär (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och socioekonomisk situation, 2017/18.

<b>Indikator</b>	<b>Flickor dålig situation</b>	<b>Flickor genom- snittlig situation</b>	<b>Flickor bra situation</b>	<b>Pojkar dålig situation</b>	<b>Pojkar genom- snittlig situation</b>	<b>Pojkar bra situation</b>
Psyko- somatiska besvär	83	69	49	55	43	29

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.4c. Barn och unga med psykosomatiska besvär (andelar i procent), 11, 13 och 15 år, fördelat på kön och födelseland, 2017/18.

<b>Indikator</b>	<b>Flickor födda i Sverige</b>	<b>Flickor födda utomlands</b>	<b>Pojkar födda i Sverige</b>	<b>Pojkar födda utomlands</b>
Psykosomatiska besvär	53	51	32	25

Källa: Skolbarns hälsovanor, en urvalsundersökning från Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.5a. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre\*, fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Suicid	15	9,4	21	14	14	16	16	17
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	↗	↗	→	→	→
Cirkulationsorganens sjukdomar	334	270	409	1,5	5,8	62	622	5 862
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘
Bröstcancer**	32	32	0,3	0,1	5,6	25	70	196
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘			→	↘	↘	↗
Lungcancer	42	41	43	0,0	0,9	19	142	198
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘		↘	↘	→	↗
Prostatacancer***	52	–	51	0,0	0,1	6,2	140	999
Utveckling inom resp. grupp	↘		↘			↘	↘	→
Tjock- och ändtarmscancer	31	26	37	0,2	1,8	14	88	266
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘		→	↘	↘	→
Läkemedels- och narkotikaförgiftn.	11	8,7	12	8,8	12	13	8,2	7,6
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗	↗	↗	→
Enligt alkoholindex	23	11	36	1,7	4,2	27	60	24
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	↘	↘	↘	↘	↗	→
Yttre orsaker	38	25	52	9,3	11	16	58	516
Utveckling inom resp. grupp	→	→	→	→	↗	→	↘	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 9.5b. Avlidna (antal per 100 000), 25 år och äldre\*, fördelat på utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Suicid	15	23	18	11
Utveckling inom resp. grupp		→	→	→
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Cirkulationsorganens sjukdomar	386	462	382	282
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Bröstcancer**	37	33	39	38
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Lungcancer	49	62	51	33
Utveckling inom resp. grupp		↗	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Prostatacancer***	61	65	61	51
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Tjock- och ändtarmscancer	36	41	37	32
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	11	27	13	6,2
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	→
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Enligt alkoholindex	26	42	31	13
Utveckling inom resp. grupp		→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp
Yttre orsaker	42	60	44	32
Utveckling inom resp. grupp		→	→	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 9.5c. Avlidna (antal per 100 000), 15 år och äldre\*, fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Suicid	15	17	17	11	7,1
Utveckling inom resp. grupp	→	↗	→	↘	↘
Cirkulationsorganens sjukdomar	334	332	381	286	239
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘		↘	↘
Bröstcancer**	32	32	33	36	26
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	↘
Lungcancer	42	40	59	49	34
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	→
Prostatacancer***	52	53	52	33	33
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘
Tjock- och ändtarmscancer	31	32	26	28	20
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	→
Läkemedels- och narkotikaförgiftningar	11	12	16	4,9	4,6
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	→	→
Enligt alkoholindex	23	24	39	11	5,8
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	↘
Yttre orsaker	38	39	43	24	24
Utveckling inom resp. grupp	→	→	↘	↘	→

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Trendanalyserna (utveckling över tid) görs för avvikande åldersspann vad gäller cancer eftersom det i de yngre åldersgrupperna är så få invånare som dör i dessa diagnoser att det begränsar möjligheten till analys. För bröstcancer, lungcancer och tjock- och ändtarmscancer ingår personer 30 och äldre, för prostatacancer personer 45 år och äldre.

\*\* För bröstcancer redovisas för totalt, ålder, utbildningsnivå och födelseland endast resultat för kvinnor, detta eftersom antalet män som får bröstcancer är så få och därför påverkar resultatet så att det ger en felaktig bild. Ett fåtal män får dock bröstcancer varje år, varför denna siffra också redovisas separat.

\*\*\* För prostatacancer redovisas endast resultat för män. Det finns ett fåtal invånare som genomgått könsbekräftande behandling vilka avlidit i prostatacancer, men dessa invånare är få vilket gör dataunderlaget för litet att analysera.

Tabell 9.6a. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2006–2019.

Indikator	Flickor första levnadsveckan	Flickor första levnads-månaden	Flickor första levnads-året	Pojkar första levnads-veckan	Pojkar första levnads-månaden	Pojkar första levnads-året
Spädbarnsdödlighet	0,9	1,2	1,9	1,1	1,5	2,2
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	→	↘

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.6b. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), första levnadsåret, fördelat på föräldrarnas utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2006–2019.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Spädbarnsdödlighet	2,1	5,4	2,3	1,6
Utveckling inom resp. grupp	↘	→	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.6c. Spädbarnsdödlighet (antal per 1 000 levande födda), första levnadsåret, fördelat på moderns födelseland, 2019 samt utvecklingen 2006–2019.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Spädbarnsdödlighet	2,1	1,8	0,8	1,8	3,2
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	→	→

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7a. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	141	115	168	336	157	82	18	11
Utveckling inom resp. grupp	↘	↗	↘	↘	↗	↗	→	→
Fallolyckor 65 år och äldre	5 446	6 054	4 657	–	–	–	4 304	13 243
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗				↗	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7b. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Våldsrelaterade skador 25 år och äldre	101	281	117	48
Utveckling inom resp. grupp		↗	→	↘
Ojämlighet mellan grupper		↗	→	Jämförelsegrupp
Fallolyckor 65 år och äldre	5 446	5 419	5 523	5 356
Utveckling inom resp. grupp		↗	↗	↗
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.7c. Vårdade i slutenvård eller specialiserad öppenvård (antal per 100 000), fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Våldsrelaterade skador 15 år och äldre	141	123	141	132	241
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	→	↘	↘
Fallolyckor 65 år och äldre	5 446	5 448	6 118	4 739	4 414
Utveckling inom resp. grupp	↗	↗	↗	↗	↗

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

Tabell 9.8a. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 15 år och äldre, fördelat på kön och ålder, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för kön är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Kvinnor	Män	15–29	30–44	45–64	65–84	85–
Hjärtinfarkt	250	161	342	1,0	18	185	662	1 604
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	→	↘	↘	↘	↘
Stroke	254	209	295	8,3	21	130	671	2 136
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↗	→	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.

Tabell 9.8b. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 25 år och äldre, fördelat på utbildningsnivå, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för utbildningsnivå är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Förgymnasial	Gymnasial	Eftergymnasial
Hjärtinfarkt	289	362	291	221
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		↘	↘	Jämförelsegrupp
Stroke	293	337	298	244
Utveckling inom resp. grupp		↘	↘	↘
Ojämlighet mellan grupper		→	→	Jämförelsegrupp

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.

Tabell 9.8c. Förstagångsinsjuknanden\* (antal per 100 000), 15 år och äldre, fördelat på födelseland, 2019 samt utvecklingen 2006–2019. Siffrorna för födelseland är åldersstandardiserade.

Indikator	Totalt	Sverige	Övriga Norden	Övriga Europa	Övriga världen
Hjärtinfarkt	250	239	285	263	281
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘			
Stroke	254	249	273	244	237
Utveckling inom resp. grupp	↘	↘	↘	↘	↘

Källa: Socialstyrelsen. Bearbetat av Folkhälsomyndigheten.

\* Efter minst 7 hjärtinfarkt- respektive strokefria år. Avlidna och slutenvårdade.



Tabell 9.9. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt\*), fördelat på kön, 2020.

<b>Indikator</b>	<b>Totalt</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Uppgift saknas</b>
Covid-19	455 503	241 817	213 557	129
Campylobakterinfektion	3 434	1 483	1 951	0
Enterohemorragisk escherichia coli (EHEC)	491	265	226	0
Salmonella	826	401	425	0
Hepatit B	804	308	494	2
Hepatit C	1 020	347	672	1
Tuberkolos	335	157	178	0
Gonorré	2 692	622	2 070	0
Klamydia	33 339	18 548	14 789	2
Hiv	364	137	227	0
Syfilis	474	38	436	0
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)	3 112	1 653	1 459	0
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)	79	36	43	0
Enterobacteriaceae med ESBL <sub>CARBA</sub>	128	59	69	0
Mässling	5	2	3	0
TBE	268	100	168	0

Källa: Folkhälsomyndigheten

\*Antalet fall kan komma att justeras något.

Tabell 9.10. Smittsamma sjukdomar (antal anmälda fall totalt), fördelat på kön, säsongen 2019/2020.

<b>Indikator</b>	<b>Totalt</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>Uppgift saknas</b>
Influensa A	5 441	2 791	2 647	3
Influensa B	2 500	1 321	1 177	2
RS-virus	1 934	981	950	3
Vinterkräksjuka	3 397	1 835	1 562	0

Källa: Folkhälsomyndigheten

---

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.



Folkhälsomyndigheten

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna Östersund Forskarens väg 3, SE-831 40 Östersund.

[www.folkhalsomyndigheten.se](http://www.folkhalsomyndigheten.se)