



Folkhälsomyndigheten

معلومات حول التطعيم بلقاح أسترا زنيكا Astra Zenecas للأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً أو أكثر

توصي دائرة صحة العامة باستخدام لقاح أسترا زنيكا ضد كوفيد-19 في السويد لحماية الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر. يُتوقع تعرّض الأشخاص بعمر 65 عاماً وأكثر إلى خطر كبير للإصابة الشديدة بمرض كوفيد-19 وخطر أقل للإصابة بالأعراض الجانبية الخطيرة لهذا اللقاح. وتقوم دائرة صحة العامة بتقييم المعلومات الجديدة حول اللقاح طوال الوقت.

من أجل حماية الأشخاص الذين يبلغون 65 عاماً وأكثر (مواليد 1956 وما قبله) ضد مرض كوفيد-19، تُقدّر دائرة صحة العامة أنه يمكن استخدام لقاح Astra Zeneca (Vaxzevria) ضد كوفيد-19 في السويد. لا يجب تطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 سنة (مواليد عام 1957) والأصغر سناً بلقاح Vaxzevria في الوقت الحالي. وهذه التوصية صالحة حتى إشعار آخر.

تم إيقاف استخدام اللقاح في منتصف شهر آذار/مارس بسبب التحقيق في عدد قليل من حالات الجلطات الدموية المقترنة بالنزيف. وقد تم الإبلاغ عن الآثار الجانبية المشتبه بها والنادرة بشكل رئيسي لدى الشباب. بعد التقرير المُقدّم من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) والمتابعة مع الخبراء في كل من السويد وبلدان أخرى، قررت دائرة صحة العامة في السويد إعادة استخدام التطعيمات للأشخاص البالغين 65 عاماً وأكثر. تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من Vaxzevria في أوروبا. يمنح اللقاح حماية جيدة جداً ضد كوفيد-19 الخطير. ويُعتقد أن التطعيم يقلّل من خطر العدوى ويساعد على تقليل انتشار كوفيد-19 في المجتمع. كل تطعيم هو خطوة نحو إمكانية العودة إلى حياة بدون القيود المفروضة في الوقت الحالي.

التطعيم يحمي من المرض

إن الإصابة بمرض كوفيد-19 وخطر الإصابة الشديدة بالمرض أمر خطير، خاصة بالنسبة لكبار السن (65 عاماً وأكثر).

إن التطعيم هو واحد من أكثر الطرق الفعالة للوقاية والحماية من الأمراض. تُحدث جميع الأدوية آثاراً جانبية وهذا ينطبق أيضاً على اللقاحات. وتُتابع مصلحة العقاقير الطبية باستمرار سلامة اللقاحات المستخدمة في السويد.

تُسبب اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تقريباً نفس النوع من الآثار الجانبية مثل بقية اللقاحات الأخرى. إن الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً هي ردود الفعل التي تعود إلى أن اللقاح يقوم بتنشيط الجهاز المناعي. قد يكون على سبيل المثال الألم، التورّم أو الحرارة في مكان الحقن، أو الشعور العام بالمرض مع صداع وحمّى. إن الآثار الجانبية عادة ما تكون خفيفة وتُمر في غضون يوم واحد.

إذا أصبحت الآثار الجانبية الجديدة معروفة، سيتم تحديث معلومات المنتج التي تصف خصائص اللقاح. ويمكن أيضاً تحديث توصيات دائرة صحة العامة بشأن كيفية استخدام اللقاح.

التحقيق في الآثار الجانبية النادرة جداً

وقد خلصت الوكالة الأوروبية للأدوية (EMA) إلى أن هناك صلة محتملة بين لقاح كوفيد-19 (Astra Zeneca Vaxzevria) وحالات نادرة جداً من جلطات الدم غير العادية بالترافق مع انخفاض الصفائح الدموية والنزيف في بعض الأحيان، وبشكل خاص لدى الشباب. تحدث هذه الأعراض لدى السكان حتى بدون تطعيم، غير أن ذلك غير مألوف جداً.

غالباً ما تظهر هذه الأعراض في مكان أو أكثر في الجسم مع أعراض حادة في غضون ثلاثة أسابيع بعد التطعيم.

من الضروري الانتباه إلى الأعراض التالية: كدمات زرقاء متعددة وجديدة أو نزيف نقطي على الجلد أو، على سبيل المثال في الفم، نزيف الأنف المطول الذي يصعب إيقافه، تورم، احمرار أو ألم واضح في الساق أو الذراع (ليس حول موقع الحقن)، صداع شديد، عدم وضوح الرؤية، ألم شديد في البطن، ضيق مفاجئ في التنفس و/ أو ألم في الصدر.

و ترتأي الوكالة الأوروبية للأدوية ومصلحة العقاقير الطبية ودائرة صحة العامة أن فوائد اللقاح تفوق خطر الإصابة بالآثار الجانبية. إن اللقاح وسيلة فعالة للوقاية من كوفيد-19 والتقليل من الإصابة الشديدة بالمرض وحالات الوفاة. وتواصل الوكالة الأوروبية للأدوية رصد التقارير عن حالات مماثلة، وتجري باستمرار تقييمات جديدة للسلامة. وتقيم دائرة صحة العامة باستمرار كيف يمكن للمعلومات الجديدة أن تؤثر على التوصية الخاصة باستخدام اللقاح في السويد.

اتصل بالرعاية الصحية إذا شعرت بالتوعك بعد التطعيم

إذا كنت تشعر بالتوعك أو القلق بعد التطعيم، يجب عليك الاتصال بمؤسسة الرعاية الصحية لكي يتسنى لنا التحقق من أعراضك، بغض النظر عما إذا كانت هذه الأعراض مرتبطة بالتطعيم أم لا. أخبر الرعاية الصحية أنك حصلت مؤخراً على التطعيم. كما يمكنكم أيضاً الاتصال على 1177 Vårdguiden. إذا مرضت بشكل طارئ، اتصل على 112.

[اقرأ المزيد من المعلومات حول التطعيم ضد كوفيد-19](#)