



Folkhälsomyndigheten

Rekommendationer för vaccination av prematura barn

Rekommendationer för vaccination med en extra dos hexavalent vaccin*			
Gestationsvecka vid födelsen	Tidigaste ålder vid vaccination	Vårdnivå vid vaccination	Övervakning efter vaccination
<26+0	Gestationsvecka 34+0 (minst 1 vecka före hemgång)	Vårdavdelning	Övervakas ineliggande i minst 48 timmar efter vaccination.
26+0 – 29+6	6+0 veckor okorrigerad ålder**	Vårdavdelning	Övervakas ineliggande i minst 48 timmar efter vaccination.
30+0 – 31+6 med samsjuklighet***	6+0 veckor okorrigerad ålder	Vårdavdelning	Övervakas ineliggande i minst 48 timmar efter vaccination.
30+0 – 31+6 utan samsjuklighet	6+0 veckor okorrigerad ålder	Vårdavdelning	Övervakas ineliggande i minst 48 timmar efter vaccination.
	8+0 veckor okorrigerad ålder	Sjukhusansluten öppenvårds- mottagning	Stannar kvar 30 minuter efter vaccination.
Fortsatta vaccinationer. För barn födda före gestationsvecka 32+0 som fått en extra dos hexavalent vaccin, vaccineras därefter enligt ordinarie vaccinationsprogram med hexavalent vaccin och konjugerat pneumokockvaccin på BVC vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder. Det bör gå minst 4 veckor mellan den extra dosen och den efterföljande dosen.			
Om första vaccinationen ges efter 10+0 veckors okorrigerad ålder, räknas denna dos som första ordinarie dos för hexavalent vaccin i ett ordinarie vaccinationsschema. Barnet vaccineras därefter på BVC enligt ordinarie vaccinationsprogram. Det bör gå minst 6 men helst 8 veckor mellan den första dosen och den efterföljande dosen.			
Vaccination mot pneumokocker ges enligt ordinarie vaccinationsprogram vid okorrigerad ålder. BCG-vaccination ges enligt rekommendation enligt okorrigerad ålder. Första dosen vaccin mot rotavirusinfektion kan ges till prematura barn från 6 och före 12 veckors okorrigerad ålder. Vaccinationen ges efter bedömning av behandlande läkare och enligt produktresumén för respektive vaccin (fass.se).			
Barn födda från gestationsvecka 32+0 till fullgången tid vaccineras enligt ordinarie vaccinationsprogram på BVC vid 3, 5 och 12 månaders okorrigerad ålder.			

* **Hexavalent vaccin:** Vaccin avsett för primär- och boostervaccinering av spädbarn och småbarn mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, *Haemophilus influenzae* typ b och hepatit B.

** **Okorrigerad ålder:** Ålder räknad från det datum då barnet är fött.

*** **Samsjuklighet:** Aktuell kardiorespiratorisk instabilitet, tidigare sepsis eller långvarig behandling med andningsunderstöd (CPAP/respirator).