



Folkhälsomyndigheten

## Calicivirus veckorapport vecka 40

---

Redaktionen

Elsie Castro och Lena Sundqvist

Denna rapport publicerades den 9 oktober 2014 och ger aktuell information om calicivirussäsongen 2014/2015

Från och med denna vecka kommer calicivirusrapporterna att publiceras varje torsdag. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177.se.



### Sammanfattning



Höstens första rapport från Folkhälsomyndigheten visar att antalet fall av noro- och sapovirus ligger på en för årstiden förväntat låg nivå. Totalt rapporterades 27 fall av norovirus och 5 fall av sapovirus under vecka 40. Även antalet sökningar på 1177.se Vårdguiden som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" ligger på en låg nivå.


Under sommaren har endast sporadiska fall av calicivirus rapporterats från landets viruslaboratorier men enstaka misstänkta utbrott av vinterkräksjuka har förekommit ute i samhället.

### Så undviker du att bli smittad

- **Var noga med handhygien**  
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan du äter eller hanterar mat. Handsprit kan med fördel användas som ett komplement.
- **Stanna hemma när du är sjuk**  
För att undvika att sprida smittan vidare är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Man kan sprida smitta under flera dygn även om man inte längre har några symptom.







I grafen ovan visar den blå linjen andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet *vinterkräksjuka* i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. När andelen passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på ordet *vinterkräksjuka* (grön linje) anser vi att spridningen tagit fart i samhället. Tidigare säsongers starter är markerade med gröna punkter. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2014 och framåt). Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laboratorieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.