



Folkhälsomyndigheten

Calicivirus veckorapport vecka 20

Redaktionen
Elsie Castro och Lena Sundqvist

Denna rapport publicerades den 21 maj 2015 och ger aktuell information om calicivirussäsongen 2014/2015.

Calicivirusrapporterna publiceras varje vecka på Folkhälsomyndighetens hemsida. Rapporterna visar antalet inrapporterade fall av calicivirus från landets viruslaboratorier samt antalet sökningar på ordet "vinterkräksjuka" på 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se.



Sammanfattning



Folkhälsomyndighetens rapport för vecka 20 visar att det totala antalet rapporterade fall av calicivirus har sjunkit jämfört med föregående vecka. Totalt rapporterades 57 fall av noro- och 6 fall av sapovirus. Fallen är spridda över landet med högst incidens i Gävleborg, Örebro och Västmanland.


Antalet sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats som inkluderar ordet "vinterkräksjuka" och som främst återspeglar spridningen av smitta i samhället ligger kvar på samma nivå som föregående vecka.

Så undviker du att bli smittad

- **Var noga med handhygien**
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och innan du äter eller hanterar mat. Handsprit kan med fördel användas som ett komplement.
- **Stanna hemma när du är sjuk**
För att undvika att sprida smittan vidare är det viktigt att stanna hemma när man är sjuk samt ytterligare ett par dagar efter tillfrisknandet. Man kan sprida smittan under flera dygn även om man inte längre har några symtom.







I grafen ovan visar den blå linjen andelen sökningar per vecka som gjorts med sökordet vinterkräxsjuka i förhållande till alla sökningar som görs på 1177.se. När andelen passerar den beräknade statistiska gränsen för normal andel sökningar på ordet vinterkräxsjuka (grön linje) anser vi att spridningen tagit fart i samhället. Tidigare säsongers startar är markerade med gröna punkter. Den statistiska gränsen visas endast för nuvarande säsong (från vecka 27, 2014 och framåt). **Starten för säsongen 2014/2015 markeras med en blå punkt.** Det tar oftast två till tre veckor innan antalet laborieverifierade fall börjar öka på motsvarande sätt efter det att spridningen i samhället tagit fart.